



ESPARUS
AGRO TRADING, S.L.
Plaza Principe, 1, 4 Dch,
39003, Santander,
Cantabria, España
CIF: B72831761

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 15 от 04.06.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Эспа-МСП30»

1. Торговое наименование кормовой добавки. Эспа-МСП 30.

Назначение. Добавку применяют молодняку сельскохозяйственным животным (телятам, пороссятам) и птице (курам-несушкам, цыплятам-бройлерам) с целью нормализации обмена веществ, повышения усвояемости и перевариваемости питательных веществ, повышения продуктивности и качества продукции животного происхождения.

2. Состав. В 1 г добавки содержится монокаприлина не менее 30 %, наполнитель – диоксид кремния.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Добавка представляет собой порошок белого или почти белого цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку выпускают упакованной в полимерные мешки массой 20 или 25 кг. Добавку хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 4 до плюс 25 °С и относительной влажности не более 85 %. Срок годности – 24 месяца с даты производства.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки. Попадая в кишечник, монокаприлин действует как ингибитор, подавляя рост патогенной флоры, не оказывая при этом негативного влияния на лакто- и бифидобактерии. Восстанавливает микрофлору, усиливает барьерную функцию кишечника, способствует восстановлению его поврежденных участков. Входя в кровь, улучшает метаболизм глюкозы и липидов, активизирует синтез противовоспалительных факторов в сыворотке крови. Обладает поверхностно-активными свойствами, в кишечнике действует как эмульгатор, улучшает образование мелкодисперсных эмульсий в кишечнике, что способствует лучшей переваримости и усвояемости питательных веществ корма. Активизирует вкусовые и обонятельные рецепторы, способствуя улучшению поедаемости кормов.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения сохранности молодняка, улучшения усвояемости и перевариваемости питательных веществ, особенно при использовании кормов низкого качества, улучшению поедаемости корма, повышения продуктивности и качества продукции животного происхождения.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки. Добавку вводят в состав комбикормов в количестве:

- телятам – 250 - 1000 г/т;
- пороссятам – 1000-2000 г/т;
- пороссятам на дорастивании и откорме, свиноматкам – 500 – 1000 г/т;
- сельскохозяйственной птице (курам-несушкам, цыплятам-бройлерам) - 500 – 1000 г/т.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация). При использовании в рекомендованных нормах ввода добавка хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Возможно развитие аллергической реакции, связанной с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам добавки.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями). Нет данных.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки. Противопоказаний к применению добавки не установлено.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после

применения кормовой добавки. Продукция животноводства (мясо, яйца) полученная от животных, которым скармливали добавку, используется без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости). Добавка нетоксична, работа с ней не требует особых мер предосторожности. При работе с добавкой необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности: использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты, исключить курение, прием воды и пищи на рабочем месте. По окончании работы с добавкой – вымыть лицо и руки с мылом. В случае попадания добавки на кожу, слизистые оболочки глаз, носа необходимо промыть их проточной водой.

13. Производитель кормовой добавки. Производитель «Хубей хорвас биотехнологии Co. LTD» («Hubei Horwath biotechnology Co.Ltd.»), Китай, № 46 ул. Гуйшань, Национальный парк развития высоких технологий, Сяньнин, провинция Хубэй, для Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading SL.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий. Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading SL.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com.

15. Порядок предъявления рекламаций. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных, потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер 21-2388-040626

