



ESPARUS
AGRO TRADING S.L.
Plaza Principi, 1, 4th fl.,
39003, Santander,
Cantabria, España
CIF: B72821761

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 162 от 03.03.2006

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Кевелаурин Альфа 90»

1. Торговое наименование кормовой добавки. Кевелаурин Альфа 90.

Назначение. Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице с целью нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения сохранности молодняка, повышения усвояемости и перевариваемости питательных веществ, а также для повышения продуктивности и качества продукции животного происхождения (мяса, яиц).

2. Состав. В 1 г добавки содержится альфа-моноголицирида лауриновой кислоты не менее 90 %.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Добавка представляет собой сыпучий порошок белого или почти белого цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку выпускают упакованной в мешки полимерные массой 25 кг. Добавку хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 4 до 25 °С и относительной влажности не более 85 %. Срок годности – 24 месяца с даты производства.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки. Альфа-моноголицирид лауриновой кислоты представляет собой моноголицирид, образованный лауриновой кислотой и глицерином. В естественных условиях содержится в молоке и обеспечивает защиту новорожденных животных от различного вида инфекций. При попадании в тонкий кишечник, практически не подвергается действию липазы, постепенно всасываются в кровь в неизменном виде, где подвергаются β-окислению. В кишечнике альфа-моноголицирил лауриновой кислоты действует наподобие реутерина - продукта жизнедеятельности молочнокислых бактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры кишечника. Способствует снижению патогенной флоры кишечника, не оказывая при этом негативного действия на лакто- и бифидобактерии, восстанавливает микробиальный баланс в кишечнике. Улучшает эмульгирование жиров, способствуя лучшему контакту содержимого кишечника с желудочным соком и пищеварительными ферментами, за счет чего улучшает доступность питательных веществ корма, повышает продуктивность животных и качество получаемой продукции.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения сохранности молодняка, улучшения усвояемости и перевариваемости питательных веществ, повышения продуктивности и качества продукции животного происхождения.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки. Добавку вводят в состав кормов, комбикормов в количестве:

- телятам - 250 - 1500 г/т;
- свиньям (пороссятам, свиноматкам) - 300-1000 г/т;
- курам-несушкам - 300-500 г/т;
- цыплятам-бройлерам - 400-600 г/т.

Для повышения продуктивности, активизации скорости роста добавку используют длительно, в т.ч. на протяжении всего периода выращивания или длительно по 10-30 дней.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация). При использовании в рекомендованных нормах ввода добавка хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Возможно развитие аллергической реакции, связанной с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам добавки.



9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями). Не изучено.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки. Добавка не имеет противопоказаний к применению.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки. Продукция животноводства (мясо, яйца), полученная от животных, которым скармливали добавку, используется без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости). Добавка нетоксична, работа с ней не требует особых мер предосторожности. При работе с добавкой необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности: использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты, исключить курение, прием воды и пищи на рабочем месте. По окончании работы с добавкой – вымыть лицо и руки с мылом. В случае попадания добавки на кожу, слизистые оболочки глаз, носа необходимо промыть их проточной водой.

13. Производитель кормовой добавки. Произведено «Вэйфан Кенон Биотехнологии», Китай (Weifang Kenon Biotechnology Co., Ltd, 00508, Pearl River West Second Street, Binhai Advanced Manufacturing Industrial Park, Weifang, Shandong, China) для Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading S.L.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий. Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading S.L.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com.

15. Порядок предъявления рекламаций. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных, потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер 21-2357-00046

