



ESPARUS
AGRO TRADING, S.L.
Plaza Principe, 1, 4 Dch,
39003, Santander,
Cantabria, España
CIF: B72831761

СОГЛАСОВАНО
Белорусский государственный
ветеринарный центр
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 35 от 14.06.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки
Экстракт сладкого каштана «Кингбраун-Р»

1. Торговое наименование кормовой добавки. Экстракт сладкого каштана «Кингбраун-Р».

Назначение. Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице с целью оптимизации работы пищеварительного тракта, повышения усвояемости и перевариваемости питательных веществ, продуктивности животных.

2. Состав. Добавка представляет собой 100 % экстракт древесины сладкого каштана. В добавке содержится полифенолов не менее 50 % в пересчете на сухое вещество.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Добавка представляет собой сыпучий порошок коричневого цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку выпускают упакованной в мешки бумажные с полимерными мешками-вкладышами мешки массой 25 кг. Добавку хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 10 до 25 °C и относительной влажности не более 85 %. Срок годности – 4 года с даты производства.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки. В состав экстракта древесины сладкого каштана входит более ста биологически активных веществ — различных полифенолов (сапонинов, танинов, а также терпенов и эллаготанинов), а также других компонентов (органических кислот, их солей, эфирных масел). Добавка обладает выраженными вяжущими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, обволакивает слизистую кишечника, защищая ее от повреждений, оказывает благоприятное влияние как на развитие ворсинок в кишечнике, так и на сохранность здоровой микрофлоры. За счет своих вяжущих свойств добавка замедляет прохождение кормового кома в кишечнике, что способствует более длительному контакту корма с пищеварительными ферментами, положительно влияет на конверсию корма и продуктивность животных.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице для нормализации работы пищеварительного тракта, повышения перевариваемости и усвояемости питательных веществ, повышения сохранности и продуктивности.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки. Добавку вводят в состав комбикормов, заменителей молока (для молодняка) в количестве:

- для крупного рогатого скота 15-30 г на голову в сутки;
- для телят молочного периода (групповым способом) – 0,2-0,4 % при вводе в ЗЦМ или 0,15-0,3 % при вводе в молоко (соответствует 5-10 г/голову при индивидуальном дозировании добавки);
- поросятам – 500 -2000 г/т;
- свиноматкам, взрослому поголовью свиней – 500 – 1000 г/т;
- курам-несушкам 300-500 г/т;
- цыплятам-бройлерам от 500 – 2000 г/т.

Длительность применения добавки 7-21 день. При необходимости повторное применение добавки может быть произведено сразу же по окончании предыдущего курса, либо прерываться на любой необходимый технологический период (обычно от 1–2 недель до нескольких месяцев).

Добавка выдерживает кратковременный нагрев до температуры не выше 110 °C и может быть использована в составе гранулированных кормов.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация). При использовании в рекомендованных нормах ввода добавка хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Возможно развитие аллергической реакции, связанной с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам добавки.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями). Не изучено.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки. Противопоказания не установлены.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки используют без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости). При работе с добавкой необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности: использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты, исключить курение, прием воды и пищи на рабочем месте. По окончании работы с добавкой – вымыть лицо и руки с мылом. В случае попадания добавки на кожу, слизистые оболочки глаз, носа необходимо промыть их проточной водой.

13. Производитель кормовой добавки. «КИНГТРИ» («KINGTREE»), Франция, (20, Бульвар Пастера, 81290, Лабрюгьер (20 Boulevard Pasteur 81290 Labruguière) для Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading SL.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий. Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading SL.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com.

15. Порядок предъявления рекламаций. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных, потребитель обращается к представителю производителя и в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер 21-2387-046626

